

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

"Sundt yver: sund fornuft giver sund økonomi"

Theun van der Veen, DVM
Vestfyns Dyrlæger A/S

Onsdag den 28. februar 2018

L & F Kvægs strategi


Reducering af
antibiotikaforbrug med 20
% i forhold til 2012 niveau

Celletal reduceres til
under 150.000

Økonomi i yversundhed



Reduktion i daglig ydelse (kg EKM) ved forskellige niveauer af celletal i forhold til et celletal på 50.000




No Management Belief Is Beyond Questioning:

We've **ALWAYS** done it this way

We've **NEVER** done it that way

David Reid

Infektionsdynamik



Forbedring af yversundhed



Kontrol dato:	8/12	19/1	16/2
Yktr. alle køer	168	152	193
- 1. kalvs	118	65	139
- 2. kalvs	155	107	109
- Øvrige	195	205	248
Mejeri			


%-andel (og antal) på kontrol dato:	8/12	19/1	16/2		Alarmgrænse
Inficerede i alt	18% (26)	15% (22)	15% (23)	✓	22 %
Nyinficerede i alt	9% (10)	8% (9)	10% (13)	✓	10 %
- 1. kontrol efter kælv., 1. kalvs	0% (0)	0% (0)	11% (1)	✗	8 %
- 1. kontrol efter kælv., øvr. kalvs	0% (0)	6% (1)	15% (2)	✓	18 %
- Øvrige (=nyinficerede i laktation)	10% (10)	8% (8)	9% (10)	✓	10 %

(Infektion: Celletal/1000 over 200 for 1. kalvs og 200 for øvrige kalvs)


Nyinfektion

To forhold som er vigtige når vi taler nyinfektion:

1



2



Bakterier




Koens immunforsvar og modstandskraft

Yversundheds handlingsplan (Mastitis Control Program)

1. Ren, tør og komfortabel staldmiljø
2. Gode malkerutiner
3. Vedligeholdelse og måling af malkeudstyr
4. Passende behandling af klinisk mastitis efter bakteriefund
5. Selektiv goldbehandling og intern pattelukning
6. Smittebeskyttelse og udsætning af kronisk inficerede køer
7. Overvågning af yversundhedsstatus

Ren, tør og komfortabel staldmiljø



Køer med score 3-4 har 1,5x højere sandsynlighed for at være inficeret end køer score 1-2.

➤Schreiner & Ruegg 2003



Gode malkerutiner




KOEN ER ET VANEDYR:

DEN VIL HAVE DEN SAMME FORBEREDELSE – DEN

SAMME VENTETID OG DEN SAMME PÅSÆTNING

HVER GANG

Gode malkerutiner




- ❑ Lag time 60-90 sek. 2x malkning
- ❑ Lag time 90-120 sek. 3x malkning
- ❑ 4 hjørner af kluden = 4 patter
- ❑ Pattespidsrengøring
- ❑ Tørre klude
- ❑ Rene handsker

Gode malkerutiner



1. Form
omve
køer
2. Heret
påsa



Gode malkerutiner



- ❑ DeLaval – brug lunkent vand i pattevasker
- ❑ Lag time -> 60 sekunder

Udstyrsnavn ★ VMS 1

VMS nummer 1

General Malkning Rengøring Kotrafik

Patterengøring

☐ Rengør to gange

Kraftig

Ingen

Ekstra let

Let

Middel

Kraftig

Fodring


Max. tid til fodring af lam foder løser

Gode malkerutiner

Patte desinfektion – formål:

- ❑ Fjerne/bryde mælkefilm
- ❑ Dræbe bakterier på patten
- ❑ Hold huden sund og blød
- ❑ Forhindre bakterier at komme ind i åben pattekanal (Barriere)

Det virker – effekt er bevist 😊



❑ Krav

- ✓ God og konsistent dækning af patter
 - ✓ Så snart centralen er fjernet
 - ✓ 75-100% dækning
- ✓ Lavt forbrug
 - ✓ Rester
- ✓ Risikofrit og nem at bruge
- ✓ God holdbarhed



Gode malkerutiner



Aktive stoffer:

- Jod (max 2500 ppm i DK = 0,25 %)
 - Kun fri jod er aktivt – forskel mellem produkter!
 - Høj fri jod indhold har god effekt
- Klordioxid
 - Skal blandes
 - Bevist effekt
- Mælkesyre
 - Findes naturligt i mælk
- Klorhexidin

Anbefalinger:

- Dokumentation for indhold
 - Især ved jod
 - EU forordning
- Indhold af blødgørere
 - Glycerin – Sorbitol > propylenglykol
- Skal nemt kunne tørres af igen (barriere)
- Pris og kvalitet hænger sammen



Vedligeholdelse og måling af malkeudstyr




Vestfyns
Dyrlægecenter

MALKNING

- Så hurtig som muligt
- Så skånsomt som muligt
- Så komplet som muligt

DILEMMA!

**I dag meget fokus på høj
mælkeflow og hurtig malkning**



Lévesque, 2005

Malkning



- ✓ Hurtig mælkeflow
 - ✓ 50% af total mælk indenfor 2 min
- ✓ Ingen bimodal malkning
- ✓ Ingen overmalkning
- ✓ Ingen unødigt belastning af pattespids
- ✓ Ingen pattekopslip

Malke rutiner (landmand)




Malke anlæg (producent)

Malkeudstyr

Pattespidsvakuum (claw vacuum)




- ✓ Pattespidsvakuum bestemmer anlægsvakuum
- ✓ Forskel mellem anlæg- og pattespidsvakuum:
 - ✓ Friction
 - ✓ Mælkeflow
 - ✓ Luftindtag



Omkoblingsniveau



- ❑ 2x malkning: 500-700 ml/min
- ❑ 3x malkning: 700-900 ml/min
- ❑ Forsinkelse på afgang: 0 sekunder
- ❑ Residual mælk – 200-300 ml



Overmalkning


- ❑ Overmalkning = malkning på (næsten) tom kirtel
- ❑ Overmalkning:
 - ❑ Vigtigste årsag til hyperkeratose
 - ❑ Mindre effektiv malkning pga. længere malketid



No Rings



Smooth Rings



Rough Rings



Very Rough Rings

Pulsatorer



- ❑ Ved fejl -> stor risiko for patteskader (synlig/usynlig)
- ❑ Ved afkobling af pulsatorslange fra central bør pulsator renses/skiftes




Fuldt vakuum under hele malkningen

Pattegummi



- ❑ Pattegummi skal passe til køerne og malkeanlæg
 - ❑ Indstillinger
 - ❑ Kravevakuum
- ❑ Kravedybde og diameter
 - ❑ Kvier ofte < 30 mm pattelængde i hvile
- ❑ Patter forlænges under malkning med ca. 40 %
- ❑ Nederste 25 mm af patten har brug for massage
- ❑ Blå/rød patter
- ❑ PATTEGUMMI ER I KONTAKT MED PATTERNE



M D Rasmussen

Slanger og placering af centraler

- ❑ Længde af slanger
- ❑ Slangeholdere
- ❑ Centralen skal hænge lige under yveret – ikke drejet eller skævt
 - ❑ Uens tømning af yveret



Passende behandling af klinisk mastitis efter bakteriefund



☐ Behandlinger

- ☐ Syge køer
- ☐ Høj behandlingseffekt (bakterie, tidspunkt, historie)

☐ Unødvendige behandlinger

- ☐ Kroniske celletalskøer
- ☐ Gentagne yverbetændelser
- ☐ Bakterier hvor behandling har begrænset effekt

Passende behandling af klinisk mastitis efter bakteriefund



Yverbetændelse

Mild

Moderat

Alvorlig

Mild

- Forandret mælk
- INGEN hævelse i yveret


Moderat

- Forandret mælk
- Hævelse i yveret
- Lidt/moderat nedsat ydelse
- IKKE almen påvirket med normal ædelyst
- Evt. let feber (max 39,2 °C)

Alvorlig

- Forandret mælk
- Hævelse i yveret
- Kraftig nedsat ydelse
- Almen påvirket med nedsat ædelyst
- Feber eller kold
- Evt. svært ved at rejse sig

Passende behandling af klinisk mastitis efter bakteriefund



Passende behandling af klinisk mastitis efter bakteriefund



❑ S. Uberis

- ❑ Miljø og smitsom
- ❑ Halm
- ❑ Goldperiode
- ❑ Rene patter

- Historie af koen
- Kroniske celletalskøer
- Kirtelsvind
- Intern pattelukning

❑ S. Dysgalactia

- ❑ Miljø
- ❑ Patte kvalitet (mikrosår, revner)

- Historie af koen

Passende behandling af klinisk mastitis efter bakteriefund



❑ S. Aureus

- ❑ Smitsom
- ❑ Malkere + robot
- ❑ Sår
- ❑ Pattedyp + goldbehandling

- Dårlig behandlingseffekt laktation
- Kroniske celletalskøer
- Kirtelsvind
- Én ko kan smitte de næste 3-4 køer v malkning

❑ CNS

- ❑ Gruppe af mange stafylokokker
- ❑ Meget alm hudbakterie
- ❑ Pattedyp

- Ingen behandling medmindre:
 - Typebestemt
 - Akut infektion

Passende behandling af klinisk mastitis efter bakteriefund



□ E. Coli

- Miljø
- Svækket ko (modstand)
- Foder – stress – mineraler
- Renlighed

- Ingen antibiotika?
- Væsketerapi + smertestillende
- Vaccination
- Døde køer

Passende behandling af klinisk mastitis efter bakteriefund



□ B-streptokokker

- Stærkt smitsom
- Mælk
- Malkning
- Goldbehandling

- Én ko kan smitte de næste 3-4 køer v malkning
- PCR
- Goldbehandling
- Pattedyp

Selektiv goldbehandling



□ Goldbehandling anbefaling:

□ Besætningsspecifik

- Prøver af køer med celletal over grænseværdi + køer med CMT 2 eller derover
- Prøver af alle køer (B-strep og S. aureus besætninger)

Enkelt kirtelprøver fra to køer med samme celletal på kontrol					
Kirtel	HF	VF	HB	VB	Samlet prøve
Uinficeret ko	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Inficeret ko	50.000	50.000	50.000	450.000	150.000

Intern pattelukning



☐ Intern pattelukning

- ☐ Reducerer nyinfektion fra goldperiode

 - ☐ Miljøbakterier – Uberis, Coli

- ☐ Alle køer

- ☐ Hygiejne!

Selektiv goldbehandling og intern pattelukning



Yversundhed, goldperiode

Seneste afsluttede 12 måneder

	Antal	Inficerede før goldning (%)	Inficerede, 1. kontrol efter kælving (%)	Nyinficerede af raske (%)	Kureret af inficerede (%)
Goldet uden behandling	73	40	18	16	79
Antibiotika goldbehandlet	23	43	17	23	90
Patteforsegling	154	12	12	13	95
Begge behandlinger	152	47	13	9	83
Goldperioder total	402	32	14	13	84


MÅL: < 10 %

MÅL: > 69 %

Seneste afsluttede 3 måneder

	Antal	Inficerede før goldning (%)	Inficerede, 1. kontrol efter kælving (%)	Nyinficerede af raske (%)	Kureret af inficerede (%)
Goldet uden behandling	27	33	11	11	89
Antibiotika goldbehandlet	2	50	0	0	100
Patteforsegling	21	10	5	5	100
Begge behandlinger	45	44	9	8	90
Goldperioder total	95	34	8	8	91

Smittebeskyttelse og udsætning af kronisk inficerede køer



□ Udsætning af kroniske køer

□ Sidst i laktation

□ Økonomi

□ Smitte fra ko til ko

□ Tab?

□ Robotmalkning



Overvågning af yversundhedsstatus



NØGLETALSTJEK > YVERSUNDHED

STATUS	NØGLETAL (ENHED)	OPNÅET	REFERENCE VÆRDI	NEDRE ALARM	ØVRE ALARM	MÅL	OPNÅET VÆRDI I FORHOLD TIL SAMMENLIGNINGSGRUPPEN	RANGERING
^ Mælk - Mejeri								
✓	Celletal (Antal)	171	154		200			6 / 45
^ Sundhed - Sygdomstilfælde								
	Yverlidelser pr. årsko (Antal)	0,56	0,69					38 / 45
^ Sundhed - Yversundhed								
✓	Inficerede i alt (%)	17	16		22			4 / 45
✓	Nyinficerede i alt (%)	9	10		10			1 / 45
✓	Nyinf. 1. kalvs, 1. kontrol e. kælvn. (%)	5	15		8			3 / 45
✓	Nyinf. øvr. kalvs, 1. kontrol e. kælvn. (%)	12	7		18			11 / 45

Overvågning af yversundhedsstatus



STATUS	NØGLETAL (ENHED)	OPNÅET	REFERENCE VÆRDI	NEDRE ALARM	ØVRE ALARM	MÅL	OPNÅET VÆRDI I FORHOLD TIL SAMMENLIGNINGSGRUPPEN	RANGERING
^ Sundhed - Yversundhed								
✓	Kurerede i goldperiode (%)	77	82	69				14 / 45
✓	Kurerede i laktation (%)	42	42	35				11 / 45
✓	Sygdomslængde, laktation (Perioder)	2,4	2,4		2,8			11 / 45
✓	Inficerede nykælvere, øvrig kalvs (%)	14	9		23			10 / 45
✓	Kronisk inficerede (%)	9	9		13			6 / 45

Periode 12 måneder eller 3 måneder (afsluttet)

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Casebesætning


Casebesætning SDM

- ❑ Sengebåsestald – 3 rækket, madrasser
- ❑ Easystrø – skraber ned 3x, strøer 1x
- ❑ 2x16 DeLaval parallel malkestald med opsamlingsplads + kodriver
- ❑ 4 malkere + 2 skoledrenge
- ❑ Start 2017 3x malkning




Yverbeseøg med malkning

Dagsydelse pr. ko (kg EKM)



Start med 3x malkning

Celletal i leveret mælk, seneste 24 måneder




Besøg d. 1/11-2017

- ❑ Yverhygiejnescore 46% score 3+4
- ❑ 3 forskellige måder at forberede køer på
- ❑ Urene patter
- ❑ Én kælvningsboks til 2-3 køer hvor alle kælver -> ofte 4 køer i den
- ❑ Tomgangsmalkning + hyperkeratose



HANDLINGSPLAN		KOMMENTARER
Malkerutiner (5+5+6) <u>Se detaljeret beskrivelse på næste side.</u> - Skum og formalk 3 kraftige stråler fra hver pat på. - Rengør patterne og pattespidser - Sæt malkemaskine på. - Fra berøring til malkemaskiner sættes på skal der gå 120 sek. - Tørre malkeklude – øge centrifugering eller bedre, investere i tørre-tumbler	✓	RENE PATTER OG PATTESPIDSER Færre <u>nyinfektioner i laktation</u> og mindre <u>celletalsudsving på kroniske celletalskøer</u> Patter skal være tørre ved påsætning
Aftagning af malkemaskiner - Aftagning hæves til minimum 700 ml	✗	Reducerer tomgangsmalkning og udtrukne pattespidser. Reducerer <u>nyinfektion i laktation</u> og øger patte-kvalitet
Båsehygiejne - Strø sengene 2 gange dagligt i stor afdeling i stalden (2x trillebør) - Renligheden af køerne vurderes igen 2-4 uger efter dette tiltag er sat i værk. - Ved manglende effekt, bruges øget mængde strøelse pr. bås	✓	Yverhygiejnescore 46 % score 3+4 Målsætning under 20 %
Kælvningsboks - Muges minimum hver 14. dag. Ved mange kælvninger muges hver uge	✓	Boksen skal altid være tørt og vel-strøet.
Goldkøer – diskuterer med besætningsdyrlæge - Intern pattelukning på alle goldkøer ved <u>afgoldning (se beskrivelse)</u> - Køer over 100.000 i celler tages en mælkeprøve og eventuelt goldbe-handling (ligesom nu)	✓	Nedsætte <u>nyinfektion i goldperioden</u> Nedsætte <u>nyinfektion ved 1. kontrol- lering efter klv.</u> Øge kureret efter goldning

Celletal i leveret mælk, seneste 24 måneder



Kontroldato:	21/11	19/12	6/2
Yktr. alle køer	405	330	217
- 1. kalvs	131	69	72
- 2. kalvs	581	369	197
- Øvrige	434	571	462
Mejeri	239	210	197

%-andel (og antal) på kontroldato:	21/11	19/12	6/2		Alarmgrænse
Inficerede i alt	30% (37)	24% (30)	21% (27)	✓	22 %
Nyinficerede i alt	13% (12)	7% (6)	8% (8)	✓	10 %
- 1. kontrol efter kælv., 1. kalvs	0% (0)	0% (0)	0% (0)	✓	8 %
- 1. kontrol efter kælv., øvr. kalvs	14% (1)	0% (0)	25% (1)	✗	18 %
- Øvrige (=nyinficerede i laktation)	14% (11)	8% (6)	8% (7)	✓	10 %

(Infektion: Celletal/1000 over 200 for 1. kalvs og 200 for øvrige kalvs)