

Salmonella Dublin – beskyt din slagtekalvebesætning

Salmonella Dublin er en bakterie, der smitter hovedsagligt med gødning og bakterien findes primært hos kvæg. Typisk vil udbrud af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under 6 måneder, men kreaturer i alle aldre kan blive syge. Symptomerne er feber, diarre, lungebetændelse, blodforgiftning, aborter samt akut dødsfald. I sjældne tilfælde kan mennesker smittes med denne Salmonella bakterie.

Indkøb af kalve

Indkøb af kalve fra leverandører udgør en væsentlig risiko for at bringe smitte ind i besætningen. Det kan være svært at holde sig opdateret med viden om leverandørenes Salmonella status. Brug derfor **KalveTjek**. Ved at bruge **KalveTjek** kan risikoen for at slæbe Salmonella smitte ind i din besætning nedsætte.

KalveTjek giver dig viden om alle dine leverandørs Salmonella niveau dags dato samt dato for sidste niveau ændring. Det er også muligt at indhente tilladelse til at få flere informationer om leverandørbesætningen.

- Brug **KalveTjek**
- Stil krav til dine leverandører
- Køb kun raske, modstandsdygtige og Salmonella-frie kalve
- Afhent selv kalvene – i udleveringsfaciliteter der ikke udgør en smitterisiko
- Afvis syge kalve

Andre eksterne smitteveje

- Udarbejd en smittebeskyttelsesplan over besætningen og arbejd ud fra denne for at beskytte besætningen
- Stil krav til besøgende og service personale, der kommer i besætningen. Hav rene støvler samt overtrækstøj klar ved indgang til besætningen samt sørg for faciliteter til håndvask. Husk god skiltning.
- Hav separat afhentningsområde for både slagtedyr samt døde dyr, så vognmænd og biler ikke kommer i kontakt med resten af besætningen
- Sørg for at bekæmpe gnaver, hvis de udgør et problem
- Undgå at sprede smitten med husdyrgødning eller maskinfællesskab. Gyllevogn eller maskinstation kan bringe smitten videre – vask disse

Undgå smitte i besætning

- Indsæt altid kalvene i rene bokse
- Hold kalvene i små hold for at nedsætte antallet af smitteveje
- Hav fokus på belægningsgrader

Forfatter: Navn, e-mail, telefonnummer

DECEMBER 2016

- Minimere graden af stres
- Flyt dyrene i hold – sektioneret drift. Dvs. ingen sammenblanding af dyr
- Opdel holdene med fast skillevægge
- Gør boksene rene mellem dyrene – effektiv rengøring: brug alkalisk sæbe og desinficer efterfølgende med et effektivt desinfektionsmiddel
- Brug ALDRIG højtryksrenser i stalde med dyr
- Redskaber bruges i et staldafsnit og rengøres efter brug
- Hold strøelse-niveau og hygiejne i boksene højt
- Mælkeskåle, fodertrug samt vandkopper/kar holdes rene og fri for gødning
- Hav fokus på støvlevask mellem holdene og afsnittene
- God hygiejne i alle staldafsnit

Besætninger med Salmonella Dublin

Hvis der er Salmonella Dublin i din besætning og den er i niveau 2 eller 3, så skal du i samarbejde med din dyrlæge gennemgå besætningen systematisk og herefter udarbejde en handlingsplan. En systematisk risikovurdering hjælper med at få overblik over mulige smitteveje samt få fokus på de steder, hvor der kræves en effektiv indsats. Handlingsplan skal være besætningsspecifik, aktiv og tidsbestemt.

Første milepæl i sanering er at stoppe mulige smitteveje til de yngste kalve. Husk at teste om indsatserne har effekt. Dette gøres ved at udtage blodprøver af en stikprøve af dyrene. Hvis der ikke kan påvises effekt, så skal handlingsplanen revurderes og nye rutiner implementeres.

Et Salmonella frit kvægbrug er målet og for at komme i mål er det en fælle opgave og et fælles ansvar at bekæmpe og undgå smittespredning med Salmonella Dublin