



Sådan sår du græs i majs

Planlæg såning af græs i majs, før du sår majs. Du kan så rødsvingel i første halvdel af maj, eller så alm. rajgræs i første halvdel af juni. I begge tilfælde påvirker det strategien for ukrudtsbekæmpelsen.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Strategien med alm. rajgræs indebærer mindst risiko for skade på majs.

Græsefterafgrøder opsamlers op til 50 kg kvælstof pr. ha, som delvist stilles til rådighed for efterfølgende afgrøder - især på lette jordtyper.

Såning af græs i majs kan være aktuelt på:

- Bedrifter med mere end 1,7 dyreenheder pr. ha, hvor mere end 70 pct. af harmoniarealet skal være tilsået med roer, græs eller græsefterafgrøder
- Bedrifter som af miljømæssige årsager ønsker at holde jorden bevokset hele året.



Billede 1. Erfaringerne fra 5-års forsøg har vist, at man let kan etablere en græsefterafgrøde i majs uden at genere majs. (Foto: John Hansen, LandboSyd)

Alm. rajgræs

Alm. rajgræs skal sås i første halvdel af juni, så den kan nå at etablere sig, inden majs lukker rækkerne i begyndelsen af juli. Alm. rajgræs er egnet på alle arealer.

Tips til såning af alm. rajgræs:

- I første halvdel af juni, når majs er 25-30 cm høj:
 - Efter anden eller tredje sprøjtning mod ukrudt med en frøåskasse monteret på en langfingerharve.
 - Sammen med radrensning, som erstatter 2. eller 3. ukrudtssprøjtning. Sås med frøåskasse monteret på radrenseren.
- Så 6 kg sildig diploid alm. rajgræs pr. ha.



Billede 2. Thyregod radrenser med efterharve. Frøene skal spredes efter tænderne på radrenseren, og frøene skal harves ned med en efterharve monteret på radrenseren. (Foto: Rolf Thostrup Poulsen).



Billede 3. Græsfrøene skal spredes foran tænderne på langfingerharven, så frøene harves ned og dækkes med jord. (Foto udlånt af CMN Maskintec A/S).

Rødsvingel

Rødsvingel skal sås tidligere end alm. rajgræs, fordi den vokser langsommere til. I et køligt forår er der risiko for, at rødsvingel vokser så kraftigt til, at det går ud over udbyttet i majs. Risikoen er mindst på arealer med en god kvælstofforsyning. Rødsvingel udelukker brug af MaisTer efter såning af græsset.

Tips til såning af rødsvingel:

- I første halvdel af maj:
 - Med frøåskasse monteret på majsåmaskinen.
 - Lige efter såning af majs med en langfingerharve monteret med frøåskasse.
- Så 6 kg rødsvingel pr. ha.
- Så rødsvingel i et 35-40 cm bredt bælte midt mellem rækkerne med majs, så der er et bælte på 15-20 cm på hver side af majsrækken uden

græs.

Ukrudt i majs med græs

Midler uden eller med begrænset græseffekt

[Callisto](#), [Tomahawk/Lodin](#), [Fighter 480](#) og [Catch](#) er bladmidler, som ikke har effekt mod etableret rajgræs og rødsvingel.

[Harmony SX](#), bør ikke anvendes på en etableret græsefterafgrøde, da væksten hæmmes.

For at fremspiringen ikke påvirkes, bør der gå en uge mellem sprøjtning med Callisto, Catch og Harmony SX og såning af rajgræsudlæg.

Midler med græseffekt

[MaisTer](#) nedbrydes hurtigt i jorden, og udlæg af alm. rajgræs til efterafgrøder kan sås 10-14 dage efter behandling med MaisTer. Såning af rødsvingel udelukker brug af MaisTer.

Bekæmpelsesforslag:

- [Majs med udlæg af rajgræs](#)
- [Majs med udlæg af rødsvingel](#)

By Rich Haddock

[Til top](#)