



VED LEMVIG ER MAJSUDBYTTET HALVERET

STØTTET AF

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Det har ikke bare været koldt, der har også blæst en kold vind fra vest i egnen omkring Lemvig. Derfor er det også et af de områder i landet, hvor den ringe sommer er gået hårdest ud over majs.

"Vi har arealer, som overhovedet ikke er blevet til noget," fortæller chefkonsulent Peder Helms, Lemvig Landboforening. Han tilføjer dog, at der er stor spredning i kvaliteten og dermed også arealer i området, der bliver færdigmodnede med over 30 pct. stivelse – hvis der vel at mærke ikke kommer nattefrost.

"I gennemsnit vil jeg tro, at vi kommer til at ligge på et udbytte omkring 6-7.000 FEN/ha, hvilket svarer til halvdelen af sidste års udbytte," fortæller han. Variationen ligger mellem 2-10.000 FEN på de enkelte marker.

"Den enorme forskel skyldes dels, at vi har nogle meget lavtliggende jorde, som har stået under vand, og derudover er der også sortsforskelle," fortæller Peder Helms. Han kan dog ikke entydigt pege på, hvilke sorter der har klaret sig bedst, da det også afhænger af de enkelte jorde.

Red hvad reddes kan

For trods alt at opnå bedst muligt udbytte og kvalitet har Peder Helms en række anbefalinger til sine kunder:

"Ved at tilføje roepiller til ensilagen kan saftafløbet begrænses. Det koster naturligvis likviditet, så alternativt kan man i stedet vælge at lægge sin majs ovenpå en dynge helsæd, der kan suge saften," fortæller han og minder om, at man endelig ikke må lægge majs ovenpå tør græsensilage, da der så kan dannes smørsyre.

"Man kan også vælge at lade majs stå lidt længere. Derved bliver planterne mere tørre, selvom det er begrænset, hvor meget mere stivelse de danner. Men det vil begrænse

saftafløbet, hvis man venter med at tage den til efter 1. november,” forklarer han.

Under normale omstændigheder kunne man øge stubhøjden, men den går iflg. konsulenten ikke i år, fordi kolberne sidder så lavt, at det ikke kan lade sig gøre. Hans bud på kvaliteten er, at den bliver under middel. Dog kan det gode vejr sidst i september og først i oktober måske have rettet lidt op på det.

Læs også:

[Sen majshøst endelig i gang](#)

[Begræns saftafløbet](#)

[Spændende muligheder med Shredladge](#)

[Ensileringsmidler eller ej](#)

[Artiklen har været bragt i kvæg NYT nr. 19 – 2015](#)